

A 2003. szeptemberi Medicus Universalis-ban megjelent kvíz megfejtései:

1-b; 2-d; 3-b; 4-b, c; 5-b; 6-b c; 7-b, c, d; 8-b, c, e; 9-b, c; 10-a; 11-f, g; 12-b, c, d; 13-a, c; 14-a, d, e; 15-b, c

1. **Mely idegyököknél fordul elő leggyakrabban porckorongsérv? (2)**
a) Th12
b) L1
c) L4
d) L5
e) S1
2. **Mely izomcsoport gyengeségét okozhatják az L4 gyök bántalmai? (1)**
a) térdhajlítók
b) térdfesztők
c) m. triceps surae
d) m. tibialis anterior
3. **Melyek a porckorongsérv abszolút műtéti indikációi? (3)**
a) gyöknek megfelelő heves fájdalom
b) motoros gyök compressiojának megfelelő paresis
c) cauda syndroma
d) vizelet, széklet incontinentia
e) ha ágynyugalom mellett 3 hétig nem szűnik a fájdalom
4. **Mely betegségekben alakul ki rigoros izomtónus fokozódás? (1)**
a) Parkinson betegség
b) Perifériás paresis
c) Centralis paresis
5. **Melyek a Parkinson betegség jellemzői? (2)**
a) hyperkinesissel jár
b) 5 év alatt teljes mozgásképtelenséghez vezet
c) legtöbbször féloldalon kezdődik
d) legelső tünet a tartási instabilitás
e) a tremor nyugalmi jellegű
6. **Melyik a két leggyakoribb oka a dementiának? (2)**
a) Metabolikus okok (vese-, májelégtelenség)
b) Vascularis dementia
c) Sclerosis multiplex
d) Alzheimer-kór
e) Parkinson-kór
7. **Melyek a Delirium tremens jellemzői?**
a) fokozottabban aluszékonnyá válik a beteg
b) főként éjjel alakul ki
c) tactilis, visualis hallucinációk jellemzik
d) 2 napi alkoholmegvonás után már jelentkeznek
e) jellemző vegetatív velejárája a tachycardia, izzadás, pupillatágulat
8. **A szélütések milyen aránya ischaemiás és vérzéses eredetű?**
a) fele ischaemiás, fele vérzéses
b) 20% ischaemiás, 80% vérzéses
c) 20% vérzéses, 80% ischaemiás
9. **Mi jellemző a Sclerosis multiplexre? (2)**
a) a szürkeállomány gócos pusztulása
b) többnyire férfiakat érint
c) leggyakrabban a 3–4. évtizedben alakul ki
d) 70%-ban shubokban zajlik
e) valószínűleg vírusos
10. **Melyek az Intracranialis nyomásfokozódás tünetei? (2)**
a) fejfájás, hányinger, hányás
b) tachycardia, alacsony vérnyomás
c) légzésszám csökken
d) facialis paresis
11. **Status epilepticus gyógyszeres ellátása, melyik nem helyes? (1)**
a) 50 ml 40%-os glükóz i.v. + 100 mg B1 vitamin i.m.
b) Seduxen p.os
c) Rivotril 0,1 mg/ttkg i.v
d) Epanutin i.v
12. **Melyek az alábbiak közül az alkoholmegvonás tünetei? (2)**
a) Alkoholos dementia
b) Delirium tremens
c) Wernicke-encephalopathia
d) GM epilepsia
e) Alkoholos paranoia
13. **Alkoholbetegnél mire gyanakszik, ha a következő tünetek állnak fenn. Ataxia, ophtalmoplegia, zavartság? (2)**
a) delirium tremens
b) B1-vitamin hiány
c) Korsakoff-szindróma
d) Wernicke-encephalopathia
e) Kisagyi atrophia
14. **Alkoholistánál tisztázatlan eredetű sopor, vagy coma esetén milyen gyógyszeres terápiát kell biztosítani (parenteralisan)? (2)**
a) B6-vitamin
b) Piracetam
c) Magas albumin tartalmú infúzió
d) Glükóz
e) B1- vitamin
15. **Mi jellemző a Korsakoff-szindrómára? (3)**
a) Confabulatio
b) Tájékozatlanság
c) Ataxia
d) Ophtalmoplegia
e) Emlékezés zavar