



1. **A WHO analgetikus létra sémáját követve a daganat okozta fájdalom csillapítása az esetek hány százalékában hatásos? (1)**
  - a) 20%
  - b) 40%
  - c) 80%
  - d) 100%
2. **A krónikus daganatos eredetű fájdalom kezelésén kívül mely területeken lehet még opiátokat alkalmazni? (2)**
  - a) Reumatológia
  - b) Neurológia
  - c) Ortopédia
  - d) Gastroenterológia
3. **A daganatos megbetegedés kapcsán mi a fájdalomcsillapító gyógyszerek dózisemelésének elsődleges oka? (1)**
  - a) a betegek kérése
  - b) a betegség progressziója
  - c) hozzászokás az ópioid fájdalomcsillapító hatásához
  - d) nem megfelelő gyógyszerválasztás
4. **Melyek a nem kielégítő fájdalomcsillapítás jelei? (3)**
  - a) étvágytalanság
  - b) lassult pulzus
  - c) depresszió
  - d) alvászavar
5. **Mi jellemző a buprenorfinra? (2)**
  - a) sublingualisan alkalmazható
  - b) nem okoz obstipációt
  - c) a NSAID-okhoz hasonlóan plafon effektusa van
  - d) a WHO lépcső 3. fokának szere
6. **A fentanyl (Durogesic) tapasztára jellemző: (2)**
  - a) nem lehet elsőként választandó szer
  - b) a hatás kialakulása 8 órán belül bekövetkezik
  - c) egyenletes plazmaszintet biztosít 72 órán át
  - d) az anatómiai hely nem befolyásolja a fentanyl bőrön keresztüli felszívódását, bőrre bárhová felhelyezhető
7. **Melyeket lehet adjuváns analgetikumként alkalmazni?**
  - a) antidepresszánsok
  - b) corticosteroidok
  - c) H2 receptor antagonisták
  - d) neuroleptikumok
8. **A fájdalom nem gyógyszeres kezelésének lehetőségei:**
  - a) pszichoterápia
  - b) elektromos ideg ingerlés (TENS)
  - c) gyógytorna
  - d) NSAID-ok
9. **A reanimáció során a mellkaskompressziók és befúvásos lélegeztetés aránya: (1)**
  - a) 5:1
  - b) 10:2
  - c) 15:2
  - d) 3:1
10. **Állítsa helyes sorrendbe a reanimáció során végzendő teendőket!**
  1. keringés vizsgálata, 2. segítségkérés, 3. infúzió bekötése, 4. átjárható légutak biztosítása, 5. befúvásos lélegeztetés
  - a) 1, 2, 3, 4, 5.
  - b) 5, 1, 2, 3, 4.
  - c) 4, 5, 1, 2, 3.
  - d) 4, 5, 2, 1, 3.
  - e) 3, 5, 1, 4, 2.
11. **Reanimáció során a Tonogén beadási módjai az alábbiak lehetnek:**
  - a) intramuscularis
  - b) intravénás
  - c) endotracheális tubusba fecskendezve NaCl-al hígítva
  - d) subcutan
12. **Melyik állítás igaz az alábbiak közül? (2)**
  - a) defibrillációt mindig csak EKG készülék egyidejű alkalmazásával lehet használni
  - b) a keringés vizsgálatára a carotis vagy femorális pulzust tapintsuk
  - c) a műfogsort reanimáció közben minden esetben el kell távolítani a szájból
  - d) a mellkaskompressziókat kb. 100/min. frekvenciával végezzük
13. **Típusos hibák reanimáció során: (2)**
  - a) tenyerünket felemeljük a mellkasfalról a kompresszió végén
  - b) kimerüléskor abbahagyjuk
  - c) EKG felszerelése a reanimáció elején
  - d) 45 perc után abbahagyjuk az újraélesztést
14. **A sikeres reanimációk hozzávetőleges aránya**
  - a) 5%
  - b) 15%
  - c) 30%
  - d) 50%