



- Mekkora az alsó végtagi mélyvénás trombózis incidenciája?**
  - 1–3 eset/10000 lakos/év
  - 1–3 eset/1000 lakos/év
  - 1–3 eset/100 lakos/év
  - 8–9 eset/1000 lakos /év
- Melyek a mélyvénás trombózis kialakulását elősegítő tényezők?**
  - immobilizáció
  - trauma
  - degeneratív hatások
  - bal szívfél elégtelenség
- Az alsó végtag mélyvénás trombózisának igazolására elsőként választandó vizsgálat:**
  - alsó végtagi vénás phlebografia
  - D-dimer teszt
  - ultrahang
  - medencei CT vizsgálat
- Melyek az akut mélyvénás trombózis tünetei?**
  - alsó végtag körfogat növekedése
  - oedema a bokák területén
  - fehér színezetű disztális végtag
  - feszülő fájdalom
- Mélyvénás trombózison kívül milyen állapotokban emelkedett még a D-dimer szintje?**
  - műtét után
  - vérzést követően
  - fertőzés fennállásakor
  - rosszindulatú folyamatban
  - terhességben
- Melyik a közösségben szerzett pneumónia leggyakoribb kórokozója?**
  - Mycoplasma pneumoniae
  - Chlamidia pneumoniae
  - Streptococcus pneumoniae
  - Haemophilus influenzae
- Melyek sorolhatók az „új kinolonok” közé?**
  - moxifloxacin
  - levofloxacin
  - ciprofloxacin
  - ofloxacin
- Mi jellemző az újfajta kinolonokra?**
  - tüdőszövetben nagyobb a koncentrációjuk, mint a szérumban
  - rövid a felezési idejük
  - kevés a mellékhatásuk
- Mennyi a moxifloxacin napi adagja területen szerzett pneumóniában?**
  - 2x200 mg
  - 1x400 mg
  - 2x400 mg
  - 2x1 g
- Területen szerzett pneumónia empirikus kezelésében elsőként választandó szer:**
  - új kinolonok
  - makrolidok
  - béta-laktám penicillinek
  - tetracyclinek
- Pneumóniában melyek a hospitalizáció szükségességére utaló jelek?**
  - zavartság
  - légzésszám >30/perc
  - testhőmérséklet >37,5 °C
  - fehérvérsejtszám <4 vagy >30 G/l
- Krónikus ischaemiás szívbetegség esetén melyek lehetnek ischaemiát provokáló állapotok?**
  - hyperthyreosis
  - magasvérnyomás betegség
  - szorongás
  - anaemia
- Melyik tartozik a krónikus stabil angina gyógyszeres kezelése közé?**
  - thrombocita-aggregáció-gátlók
  - béta blokkolók
  - ACE-gátlók
  - lipidszint csökkentők
  - ösztrogén pótló kezelés
- Melyik állítás igaz a pityriasis rosea-ra?**
  - serdülőkorúakban és fiatal felnőttekben gyakoribb
  - főleg nyáron észlelhető
  - elsőként egy „anyafolt” jelenik meg
  - „karácsonyfa tünetet” ad, a bőrredők vonalait követve